

Geometria B

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
A.A. 2021/2022
6 febbraio 2023

Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata. Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni. Il tempo a disposizione è di tre ore.

Esercizio 1. Sia $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ l'insieme delle parti della retta reale \mathbb{R} . Definiamo il sottoinsieme ξ di $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ ponendo

$$\xi := \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(-r, r) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid r \in \mathbb{R}, r > 0\}.$$

- (1a) Si dimostri che ξ è una topologia su \mathbb{R} strettamente meno fine della topologia euclidea di \mathbb{R} .
- (1b) Si dimostri che l'intervallo $(-1, 2]$ è un sottoinsieme compatto di (\mathbb{R}, ξ) .
- (1c) Sia ξ^\bullet la topologia prodotto su $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ di ξ con ξ . Si dimostri che il sottospazio topologico $Y := \{(0, 0), (1, 1)\}$ di $(\mathbb{R}^2, \xi^\bullet)$ è connesso per archi.

Esercizio 2. Sia \mathbb{R} la retta reale dotata della topologia euclidea, sia I l'intervallo $[0, 2]$ di \mathbb{R} dotato della topologia relativa e sia \mathcal{R} la relazione di equivalenza su I tale che $[x]_{\mathcal{R}} = [0, 1] \cup \{2\}$ se $x \in [0, 1] \cup \{2\}$ e $[x]_{\mathcal{R}} = \{x\}$ se $x \in (1, 2)$. Indichiamo con I/\mathcal{R} lo spazio topologico quoziente di I modulo \mathcal{R} .

- (2a) Si dimostri che I/\mathcal{R} è T_2 .
- (2b) Si dimostri che la proiezione naturale $\pi : I \rightarrow I/\mathcal{R}$ è chiusa.

Esercizio 3. Siano X e Y i sottospazi topologici di \mathbb{R}^3 così definiti

$$X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1, z = 0\}, \quad Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}.$$

Sia $Z = \mathbb{R}P^2$ il piano proiettivo.

- (3a) Si calcoli il gruppo fondamentale di X .
- (3b) Si stabilisca se esiste una retrazione $r : X \rightarrow A$, con A sottospazio di X omeomorfo a Y o a Z . In caso positivo, dire se si tratta di un retratto di deformazione.

Esercizio 4. (4a) Sia γ la circonferenza unitaria, percorsa in senso antiorario. Si calcoli l'integrale di linea

$$I = \int_{\gamma} \frac{dz}{z^2(z - 1/2)}$$

- (4b) Mostrare che la funzione $f(z) = e^z + 5z^3 + 1$ ha tre zeri nel disco unitario aperto D .